

**INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI INSERIMENTO DI UN SISTEMA INTRAUTERINO A SCOPO CONTRACCETTIVO - IUS - A RILASCIO ORMONALE**

Io sottoscritta ..... nata a .....  
il..... dichiaro di essere stata informata il..... dal dr. ....

DOPO IL COLLOQUIO ILLUSTRATIVO DEI VARI METODI CONTRACCETTIVI (CONTRACCZIONE ORMONALE - pillola, anello vaginale, cerotto contraccettivo -, CONTRACCZIONE MECCANICA CON IUD O PROFILATTICO, STERILIZZAZIONE CHIRURGICA) E LA VALUTAZIONE ANAMNESTICO CLINICA

**RICHIEDO L'INSERIMENTO DI JAYDESS – SISTEMA A RILASCIO INTRAUTERINO (IUS) DI ORMONE LEVONORGESTREL A SCOPO CONTRACCETTIVO**

**INFORMAZIONI GENERALI**

JAYDESS È UN DISPOSITIVO CHE VIENE INSERITO NELL'UTERO E RILASCIA UN ORMONE (LEVONORGESTREL) AD UN BASSO DOSAGGIO PER 3 ANNI. L'ORMONE IMPEDISCE LA GRAVIDANZA AGENDO SULL'ENDOMETRIO, SUL MUOCO CERVICALE E SULL'ATTIVITÀ DEGLI SPERMATOZOI MENTRE L'OVULAZIONE NON VIENE MODIFICATA NELLA QUASI TOTALITÀ DELLE DONNE CHE LO USANO.

DOPO L'INSERIMENTO DA PARTE DEL GINECOLOGO È RACCOMANDATO OSSERVARE ALCUNE ORE DI RIPOSO ED ASTENERSI DAI RAPPORTI SESSUALI PER I PRIMI 15 GIORNI. E' NECESSARIO EFFETTUARE IL PRIMO CONTROLLO GINECOLOGICO DOPO 4 -6 SETTIMANE ED IN SEGUITO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO.

IN RARI CASI IL DISPOSITIVO PUÒ SPOSTARSI DALLA SUA SEDE ED ESSERE ESPULSO; TALVOLTA, POI, IL FILO DEL DISPOSITIVO PUO' RISALIRE DENTRO L'UTERO ED IN QUESTO CASO PUÒ ESSERE NECESSARIA LA SUA RIMOZIONE IN OSPEDALE.

L'UTILIZZO DI JAYDESS **NON** SERVE A PROTEGGERE DALLE INFEZIONI CHE SI POSSONO TRASMETTERE DURANTE IL RAPPORTO SESSUALE.

**EFFICACIA**

L'EFFICACIA CONTRACCETTIVA E' MOLTO ELEVATA E **DURA 3 ANNI**. DOPO 3 ANNI IL DISPOSITIVO VA RIMOSSO DAL GINECOLOGO .

LA PERCENTUALE DI INSUCCESSO È INTORNO ALLO 0.4% NEL PRIMO ANNO E ALLO 0.9% A TRE ANNI: QUINDI SU 100 DONNE CHE LO UTILIZZANO MENO DI 1 (UNA) RIMANE INCINTA NONOSTANTE IL SUO UTILIZZO.

L'ESPULSIONE DEL DISPOSITIVO ANNULLA L'EFFETTO CONTRACCETTIVO.

**I RISCHI**

IL DISPOSITIVO MENTRE VIENE INSERITO PUÒ PENETRARE NELLA CAVITÀ UTERINA O PERFORARLA: LA POSSIBILITÀ CHE QUESTO SUCCEDA È INFERIORE A 1 CASO OGNI 1000 INSERIMENTI. IL RISCHIO AUMENTA IN CASO DI INSERIMENTO DURANTE IL POST-PARTO O L'ALLATTAMENTO.

DURANTE L'APPLICAZIONE DEL DISPOSITIVO SI POSSONO AVERE VARIAZIONI DEL BATTITO CARDIACO E DELLA PRESSIONE ARTERIOSA PER STIMOLAZIONE NERVOSA DELL'UTERO. IN RARISSIMI CASI SI PUÒ VERIFICARE UN COLLASSO (SHOCK VAGALE). LA PROCEDURA PUÒ SCATENARE UNA CRISI EPILETTICA NELLE DONNE AFFETTE DA EPILESSIA.

**IN CIRCA META' DELLE GRAVIDANZE INSORTE DURANTE L'USO DI JAYDESS L'IMPIANTO DELL'OVULO FECONDATO AVVIENE AL DI FUORI DELL'UTERO E QUESTO E' POTENZIALMENTE PERICOLOSO. IN CASO DI ASSENZA DI MESTRUAZIONE O DOLORE AL BASSO VENTRE O EMORRAGIA BISOGNA SEMPRE CONSULTARE SUBITO UN GINECOLOGO.**



DISTRETTO N ...  
STRUTTURA

NUMEMERI TEL. DI RIFERIMENTO

**INFORMAZIONE DATA ALLA DONNA TRAMITE INTERPRETE / MEDIATORE CULTURALE**

Nome e Cognome (stampatello).....  
Firma.....documento.....Data.....

Nome e Cognome (stampatello).....  
Firma.....documento.....Data.....