



INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE TERAPIA RADIOMETABOLICA CON RA-223 DICLORURO

Il Radio-223 dicloruro (Xofigo) è indicato per il trattamento di soggetti adulti affetti da carcinoma della prostata resistente alla castrazione con metastasi ossee sintomatiche e senza metastasi viscerali note.

Sono previste 6 somministrazioni a distanza di 4 settimane.

Prima del trattamento

- ◆ In corso di visita medico nucleare pre-trattamento viene verificata l'appropriatezza del trattamento e la raccolta dell'anamnesi (incluso esami di laboratorio, test diagnostici eseguiti e terapia pregresse e in atto).
- ◆ Controllo esami ematochimici recenti (< 2 settimane) : emocromo con formula, funzionalità epatica, funzionalità renale, PSA totale, Fosfatasi Alcalina, elettroforesi proteine.

Il Giorno del Trattamento

- ◆ Il trattamento viene eseguito in regime ambulatoriale, presso la Struttura Complessa di Medicina Nucleare Ospedale Cattinara ASUGI
- ◆ Ra223 è somministrato per via endovenosa mediante iniezione lenta
- ◆ Dopo il trattamento con Ra223 il paziente viene monitorizzato per un breve periodo in medicina nucleare (4-5 ore)

NORME DI COMPORTAMENTO AL RIENTRO A CASA

La maggior parte della radioattività verrà eliminata con le feci e con le urine. Per qualche tempo, tuttavia, un po' di radioattività rimarrà nel corpo, per cui sono necessarie alcune precauzioni per le persone che si trovino vicine a voi. E' vostra responsabilità proteggere i familiari, gli amici, i colleghi e le altre persone.

Le seguenti indicazioni sono intese a chiarirvi le idee su alcune semplici precauzioni da porre in atto per una settimana dalla somministrazione.

Se le rimarranno dubbi, chieda liberamente allo specialista Medico Nucleare.

- ◆ Andando in bagno evitare ogni perdita d'urina al di fuori del WC. Anche gli uomini dovranno quindi urinare seduti. Pulitevi in ogni caso

con carta igienica e azionate lo sciacquone per due/tre volte. È importante che vi laviate subito le mani. Nel caso in cui l'abitazione sia provvista di doppi servizi igienici è comunque opportuno riservarne uno per sé.

- ◆ Pulire bene eventuali spargimenti di urina, sangue, vomito, ecc. ed eliminarli nel WC.
- ◆ Ridurre al minimo i contatti con le donne in stato di gravidanza. Cercate di rimanere sempre ad almeno 1 metro di distanza.
- ◆ Evitare i rapporti sessuali per una settimana dalla somministrazione. I rapporti sessuali nella prima settimana dalla somministrazione sono consentiti in caso di utilizzo del preservativo.
- ◆ Se i vostri figli/nipoti hanno meno di dieci anni, a scopo precauzionale cercate di evitare i contatti a distanza ravvicinata e quindi non prendeteli in braccio e non accarezzateli a lungo.
- ◆ A scopo precauzionale, i vostri figli/nipoti con età inferiore a due anni devono essere assistiti da un'altra persona. Se possibile, fate in modo di affidarli a parenti o ad amici.

RIPRESA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

La ripresa della normale attività lavorativa sarà di volta in volta concordata con il medico curante specialista.

Redatto da Comunicazione, Relazioni esterne aziendali, Ufficio stampa, URP ASUGI
su testo fornito dalla Struttura Complessa Medicina Nucleare

Struttura Complessa di MEDICINA NUCLEARE

Direttore: dott.ssa Franca Dore

Strada di Fiume 447 – 34 149 Trieste

Segreteria appuntamenti PET/TC: tel: 040 – 399 3380

Segreteria appuntamenti Scintigrafie: tel: 040 – 399 3379

Fax: 040 – 399 3382

e-mail: franca.dore@asugi.sanita.fvg.it

Coordinatore Tecnico: Marzia Zennaro

Tel: 040 – 399 3370 Fax: 040 – 399 3382

e-mail: marzia.zennaro@asugi.sanita.fvg.it

Revisione 03 – maggio 2022