

SCHEDA TECNICA CISTOGRAFIA RADIOISOTOPICA



Cistografia radioisotopica

Denominazione tecnica

Studio del reflusso vescico-ureterale 92.03.4

Principio

E' possibile rilevare la risalita del tracciante radioattivo (Tc-99m DTPA, TC-99m MAG3) dalla vescica negli ureteri e quindi valutare la presenza e l'entità del reflusso vescico-ureterale

Preparazione del paziente

• Idratazione ed eventuale posizionamento di un catetere vescicale

Indicazioni tecniche

- Il tempo necessario per l'indagine è variabile da 30 a 60 minuti
- Non sono note controindicazioni nè effetti collaterali
- Si possono seguire due metodi:
- e il metodo diretto consiste nel riempimento della vescica, mediante un catetere, con soluzione fisiologica contenente il tracciante radioattivo
- Il metodo indiretto consiste nella esecuzione dell'indagine al termine della scintigrafia renale sequenziale evitando pertanto il cateterismo

Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche

Reflussi vescico-ureterali: valutazione di sede e stima dell'entità del reflusso



Strada di Fiume 447 – 34149 Trieste medicina-nucleare@asugi.sanita.fvg.it; asugi.sanita.fvg.it

Redatto da Comunicazione, Relazioni esterne aziendali, Ufficio stampa, URP ASUGI su testo fornito dalla Struttura Complessa Medicina Nucleare

Struttura Complessa di MEDICINA NUCLEARE Direttore: dott.ssa Franca Dore

Strada di Fiume 447 – 34 149 Trieste

Segreteria appuntamenti PET/TC: tel: 040 – 399 3380 Segreteria appuntamenti Scintigrafie: tel: 040 – 399 3379

Fax: 040 – 399 3382

e-mail: franca.dore@asugi.sanita.fvg.it

Coordinatore Tecnico: Marzia Zennaro

Tel: 040 – 399 3370 Fax: 040 – 399 3382 e-mail: marzia.zennaro@asugi.sanita.fvg.it

Revisione 01 - marzo 2021