



# VITREORETINOPATIA ESSUDATIVA FAMILIARE

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

La vitreoretinopatia essudativa familiare ( sindrome di Criswick-Schepens) è una condizione lentamente progressiva caratterizzata da avascolarità della periferia temporale retinica.

## **ORIGINI E DIFFUSIONE**

Autosomica dominante e raramente legata al cromosoma X recessiva con alta penetranza ed espressività variabile.

Presentazione: alla fine dell'infanzia.

## **CRITERI DIAGNOSTICI**

**SEGNI** riscontrabili al biomicroscopio con lampada a fessura (in ordine di comparsa) :

- Degenerazione vitreale e aderenze vitreoretiniche periferiche associate ad aree di “bianco senza pressione”.
- Tortuosità vascolare periferica, teleangectasie, neovascolarizzazioni, emorragie ed essudati sottoretinici.
- Proliferazione fibrovascolare e trazioni vitreoretiniche che provocano la formazione di “ridge” (cresta), rettilineizzazione dei vasi, distacco retinico localizzato e “dragging” (stiramento) temporale della macula.
- Importante distacco retinico trazionale, massiva essudazione sottoretinica , cheratopatia a bandelletta, cataratta e glaucoma.

## **DIAGNOSI DIFFERENZIALI**

Simile alla retinopatia del prematuro, ma non associata a basso peso alla nascita e prematurità.

## **INDAGINI SPECIALISTICHE**

Elettroretinogramma: normale.

Fluorangiografia: mostra le aree retiniche periferiche di non-perfusione ed evidenzia lo stiramento dei vasi retinici.

Redatto Comunicazione, Relazioni esterne aziendali, Ufficio stampa, URP  
ASUGI su testo fornito dalla Clinica Oculistica, approvato dalla Società  
Oftalmologia Italiana

**Unità Clinica Operativa CLINICA OCULISTICA**

**Direttore: Prof. Daniele Tognetto**

Tel: 040 – 399 2243; Fax: 040 – 772 449

e-mail: [tognetto@units.it](mailto:tognetto@units.it)

**Coordinatore Infermieristico Reparto: Elena Kiss**

Tel: 040 – 399 2536; Fax: 040 – 399 2572

e-mail: [elena.kiss@asugi.sanita.fvg.it](mailto:elena.kiss@asugi.sanita.fvg.it)

Revisione 01 – maggio 2022