

Quando eseguire la seconda somministrazione?

Dopo la prima somministrazione le verrà dato un appuntamento **a 28 giorni** per eseguire la seconda dose del vaccino.

È fondamentale eseguire entrambe le dosi del vaccino: **una sola dose non protegge dal virus.**

Se non si sente bene quando deve eseguire la seconda dose, aspetti fino a completa ripresa.



Segnalazione di reazioni avverse

Qualora dopo la somministrazione del vaccino abbia sviluppato una reazione avversa, può segnalarlo lei direttamente tramite la piattaforma Vigifarmaco (www.vigifarmaco.it).

Ulteriori informazioni

Il vaccino che ha ricevuto riduce la possibilità di ammalarsi di COVID-19, ma non azzerà il rischio.

La protezione data dal vaccino inizierà **14 giorni** dopo la seconda dose.

Continui ad adottare le seguenti precauzioni per evitare il contagio:

1. Allontanamento sociale
2. Indossare la mascherina
3. Lavare spesso le mani in modo accurato

Conservare la green-card consegnata dopo la prima somministrazione e **presentarla il giorno della seconda dose.**



moderna®

Cosa aspettarsi dopo la
vaccinazione COVID-19
Vaccine Moderna®

Possibili effetti indesiderati

- Dolore al braccio
- Stanchezza
- Mal di testa
- Dolori generali
- Sintomi simil-influenzali
- Tumefazione o dolore ascellare
- Nausea
- Febbre



In caso di febbre, assumere paracetamolo 500 mg al bisogno (massimo 3.000 mg al giorno divisi in 6 somministrazioni).

In caso di febbre alta, se i sintomi persistono più di 7 giorni o se peggiorano, contattare il medico.

Dopo il vaccino si possono svolgere le normali attività quotidiane?

Sì, tenendo conto delle seguenti raccomandazioni:

- qualora il braccio sia dolorante, eviti di sollevare carichi
- in caso di stanchezza, riposi ed eviti di utilizzare macchinari o di guidare



Ci si può ammalare di COVID-19 a causa del vaccino?

No, ma è possibile che lei sia stato contagiato prima della vaccinazione e non abbia manifestato i sintomi.

Non presentarsi alla vaccinazione se:

- prima della vaccinazione ha sintomi riconducibili al COVID-19
- è in isolamento fiduciario
- è in attesa del risultato di un tampone



I vaccini COVID non sono intercambiabili

Se ha ricevuto una prima dose di COVID-19 vaccine Moderna, la seconda dose dovrà essere fatta **con lo stesso vaccino**.