

**প্যাকেজ লিফলেট: ব্যবহারকারীর জন্য তথ্য**

**Comirnaty Original/Omicron BA.1(15/15 মাইক্রোগ্রাম)/ইনজেকশন জন্য বিচ্ছুরণ জন্য ডোজ ঘনীভূত  
12 বছর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক এবং কিশোর-কিশোরীরা  
COVID-19 mRNA ভ্যাকসিন (নিউক্লিওসাইড পরিবর্তিত)  
tozinameran/riltozinameran**

এই ওষুধটি অতিরিক্ত পর্যবেক্ষণের বিষয়। এটি নতুন নিরাপত্তা তথ্য দ্রুত সনাক্ত করার অনুমতি দেবে। আপনি পেতে পারেন কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রিপোর্ট করে সাহায্য করতে পারেন। কিভাবে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রিপোর্ট করতে হয় সে জন্য বিভাগ 4 এর শেষ দেখুন।

**আপনি এই ভ্যাকসিন গ্রহণ করার আগে এই সমস্ত লিফলেটটি সাবধানে পড়ুন কারণ এতে আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে।**

- এই লিফলেটটি রাখুন। আপনি আবার এটি পড়তে প্রয়োজন হতে পারে।
- আপনার যদি আরও কোনো প্রশ্ন থাকে, আপনার ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট বা নার্সকে জিজ্ঞাসা করুন।
- যদি আপনি কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পান, আপনার ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট বা নার্সের সাথে কথা বলুন। এই লিফলেটে তালিকাভুক্ত নয় এমন সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত। বিভাগ নং 4 দেখুন।

**কি আছে এই লিফলেটে**

1. Comirnaty Original/Omicron BA.1 কি এবং এটি কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়
2. Comirnaty Original/Omicron BA.1 পাওয়ার আগে আপনার যা জানা দরকার
3. কিভাবে Comirnaty Original/Omicron BA.1 দেওয়া হয়
4. সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
5. কিভাবে Comirnaty Original/Omicron BA.1 সংরক্ষণ করবেন
6. প্যাকেজের বিষয়বস্তু এবং অন্যান্য তথ্য

**1. Comirnaty Original/Omicron BA.1 কি এবং এটি কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়**

Comirnaty Original/Omicron BA.1 হল একটি ভ্যাকসিন যা SARS-CoV-2 দ্বারা সৃষ্ট COVID-19 প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। এটি 12 বছর বা তার বেশি বয়সের প্রাপ্তবয়স্ক এবং কিশোর-কিশোরীদের দেওয়া হয়।

Comirnaty Original/Omicron BA.1 শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিদের জন্য যারা আগে COVID-19 এর বিরুদ্ধে অন্তত একটি প্রাথমিক টিকা গ্রহণ করেছেন।

ভ্যাকসিনটি ইমিউন সিস্টেমকে (শরীরের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা) অ্যান্টিবডি এবং রক্তকণিকা তৈরি করে যা ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে, তাই COVID-19 এর বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়।

Comirnaty Original/Omicron BA.1-এ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরির জন্য ভাইরাস থাকে না এবং তাই এটি আপনাকে COVID-19 দিতে পারে না।

**2. Comirnaty Original/Omicron BA.1 পাওয়ার আগে আপনার যা জানা দরকার**

**Comirnaty Original/Omicron BA.1 দেওয়া উচিত নয়**

- যদি আপনার সক্রিয় পদার্থ বা এই ওষুধের অন্য কোনো উপাদানে অ্যালার্জি থাকে (বিভাগ 6 এ তালিকাভুক্ত)

**পূর্ব সতর্কীকরণ এবং সাবধানতা**

আপনি ভ্যাকসিন গ্রহণ করার আগে আপনার ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট বা নার্সের সাথে কথা বলুন যদি:

- অন্য কোনও ভ্যাকসিন ইনজেকশন দেওয়ার পরে বা অতীতে আপনাকে Comirnaty দেওয়ার পরে আপনার কখনও গুরুতর অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া বা শ্বাসকষ্ট হয়েছে।
- আপনি টিকা দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে নার্ভাস বোধ করছেন বা কোনো সুই ইনজেকশনের পরে কখনও অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

- আপনার একটি গুরুতর অসুস্থতা বা উচ্চ স্বরের সংক্রমণ রয়েছে। যাইহোক, আপনার যদি হালকা স্বর বা সর্দি-কাশির মতো উপরের শ্বাসনালীতে সংক্রমণ থাকে তবে আপনি আপনার টিকা নিতে পারেন।
- আপনার রক্তপাতের সমস্যা আছে, আপনি সহজেই ক্ষত তৈরি করেন বা আপনি রক্ত জমাট বাঁধা প্রতিরোধ করার জন্য একটি ওষুধ ব্যবহার করেন।
- এইচআইভি সংক্রমণের মতো রোগ বা কর্টিকোস্টেরয়েডের মতো ওষুধ যা আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে তার কারণে আপনার দুর্বল ইমিউন সিস্টেম রয়েছে।

Comirnaty টিকা দেওয়ার পরে মায়োকার্ডাইটিস (হৃদপিণ্ডের পেশীর প্রদাহ) এবং পেরিকার্ডাইটিস (হাটের বাইরের আস্তরণের প্রদাহ) হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় (বিভাগ 4 দেখুন)। এই অবস্থাগুলি টিকা দেওয়ার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে বিকাশ করতে পারে এবং প্রাথমিকভাবে 14 দিনের মধ্যে ঘটে। দ্বিতীয় টিকা দেওয়ার পরে এগুলি প্রায়শই পরিলক্ষিত হয় এবং প্রায়শই অল্প বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে। টিকা দেওয়ার পরে, আপনার মায়োকার্ডাইটিস এবং পেরিকার্ডাইটিসের লক্ষণগুলির বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত, যেমন শ্বাসকষ্ট, ধড়ফড় এবং বুকে ব্যথা, এবং এইগুলি ঘটলে অবিলম্বে চিকিত্সার পরামর্শ নেওয়া উচিত।

যেকোনো ভ্যাকসিনের মতো, Comirnaty Original/Omicron BA.1 যারা এটি গ্রহণ করে তাদের সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করতে পারে না এবং আপনি কতক্ষণ সুরক্ষিত থাকবেন তা জানা নেই।

Comirnaty Original/Omicron BA.1-এর কার্যকারিতা এমন লোকেদের মধ্যে কম হতে পারে যারা ইমিউনো কমপ্রোমাইজড। এই ক্ষেত্রে, আপনাকে COVID-19 প্রতিরোধে সহায়তা করার জন্য শারীরিক সতর্কতা বজায় রাখা উচিত। উপরন্তু, আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচিতিদের উপযুক্ত হিসাবে টিকা দেওয়া উচিত। আপনার ডাক্তারের সাথে উপযুক্ত পৃথক সুপারিশ আলোচনা করুন।

## শিশুরা

Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 মাইক্রোগ্রাম) / ইনজেকশনের জন্য বিচ্ছুরণের জন্য ডোজ ঘনীভূত 12 বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য সুপারিশ করা হয় না।

## অন্যান্য ওষুধ এবং Comirnaty

আপনার ডাক্তার বা ফার্মাসিস্টকে বলুন যদি আপনি ব্যবহার করছেন, সম্প্রতি ব্যবহার করেছেন বা অন্য কোনো ওষুধ ব্যবহার করতে পারেন বা সম্প্রতি অন্য কোনো ভ্যাকসিন পেয়েছেন।

## গর্ভাবস্থা এবং বুকের দুধ খাওয়ানো

আপনি যদি গর্ভবতী হন বা মনে করেন আপনি গর্ভবতী হতে পারেন, তাহলে এই টিকা নেওয়ার আগে আপনার ডাক্তার, নার্স বা ফার্মাসিস্টকে বলুন।

গর্ভাবস্থায় Comirnaty Original/Omicron BA.1-এর ব্যবহার সম্পর্কিত কোনও তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। যাইহোক, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ট্রিমাস্টিকে প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত কমিরনাটি ভ্যাকসিনের মাধ্যমে টিকা নেওয়া গর্ভবতী মহিলাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে তথ্য গর্ভাবস্থা বা নবজাত শিশুর উপর নেতিবাচক প্রভাব দেখায়নি। প্রথম ট্রিমাস্টিকে টিকা দেওয়ার পরে গর্ভাবস্থা বা নবজাত শিশুর উপর প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সীমিত হলেও, গর্ভপাতের ঝুঁকিতে কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি। Comirnaty Original/Omicron BA.1 গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় Comirnaty Original/Omicron BA.1-এর ব্যবহার সম্পর্কিত কোনও তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। যাইহোক, বুকের দুধ খাওয়ানো নবজাতক/শিশুর উপর কোন প্রভাব প্রত্যাশিত নয়। প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত Comirnaty ভ্যাকসিনের সাথে টিকা দেওয়ার পরে স্তন্যপান করানো মহিলাদের থেকে পাওয়া তথ্য বুকের দুধ খাওয়ানো নবজাতক/শিশুদের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাবের ঝুঁকি দেখা যায় নি। Comirnaty Original/Omicron BA.1 বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় ব্যবহার করা যেতে পারে।

## ড্রাইভিং এবং মেশিন ব্যবহার

বিভাগ 4 এ উল্লিখিত টিকাদানের কিছু প্রভাব (সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া) সাময়িকভাবে আপনার গাড়ি চালানো বা মেশিন ব্যবহার করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে। আপনি গাড়ি চালানো বা মেশিন ব্যবহার করার আগে এই প্রভাবগুলি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

### 3. কিভাবে Comirnaty Original/Omicron BA.1 দেওয়া হয়

Comirnaty Original/Omicron BA.1 আপনার উপরের বাহুর একটি পেশীতে 0.3 mL ইনজেকশন হিসাবে দেওয়া হয়। Comirnaty Original/Omicron BA.1 একটি COVID-19 ভ্যাকসিনের সাম্প্রতিকতম ডোজ দেওয়ার কমপক্ষে 3 মাস পরে দেওয়া যেতে পারে।

Comirnaty Original/Omicron BA.1 শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিদের জন্য নির্দেশিত যারা আগে COVID-19-এর বিরুদ্ধে অন্তত একটি প্রাথমিক টিকা গ্রহণ করেছেন।

বুস্টার ডোজ এর জন্য যোগ্যতা এবং সময় সম্পর্কে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে অনুগ্রহ করে চেক করুন।

12 বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তিদের প্রাথমিক টিকাদান কোর্সের বিস্তারিত জানার জন্য, অনুগ্রহ করে Comirnaty 30 মাইক্রোগ্রাম/ ইনজেকশনের জন্য ডোজ ডিসপারসন বা Comirnaty 30 মাইক্রোগ্রাম/ইনজেকশন জন্য বিচ্ছুরণ জন্য ডোজ ঘনীভূত-এর প্যাকেজ লিফলেট দেখুন।

Comirnaty Original/Omicron BA.1 ব্যবহার সম্পর্কে আপনার যদি আরও কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে আপনার ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট বা নার্সকে জিজ্ঞাসা করুন।

### 4. সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

সমস্ত ভ্যাকসিনের মত, Comirnaty Original/Omicron BA.1 এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে, যদিও সবাই তা পায় না।

**খুব সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** 10 জনের মধ্যে 1 জনের বেশি প্রভাবিত করতে পারে

- ইনজেকশন সাইট: ব্যথা, ফোলা
- ক্লান্তি
- মাথাব্যথা
- পেশী ব্যথা
- ঠান্ডা লাগা
- সংযোগে ব্যথা
- ডায়রিয়া
- জ্বর

এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে কিছু প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় 12 থেকে 15 বছরের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে কিছুটা বেশি ঘন ঘন দেখা যায়।

**সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** 10 জনের মধ্যে 1 জনকে প্রভাবিত করতে পারে

- ইনজেকশন সাইটের লালভাব
- বমি বমি ভাব
- বমি

**অস্বাভাবিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** 100 জনের মধ্যে 1 জনকে প্রভাবিত করতে পারে

- বর্ধিত লিম্ফ নোড (বুস্টার ডোজ পরে আরও ঘন ঘন দেখা যায়)
- অসুস্থ বোধ
- বাহতে ব্যথা
- অনিদ্রা
- ইনজেকশন সাইটে চুলকানি
- এলার্জিক প্রতিক্রিয়া যেমন ফুসকুড়ি বা চুলকানি
- দুর্বল বোধ বা শক্তির অভাব/নিদ্রা অনুভব করা
- ক্ষুধা কমে যাওয়া
- অত্যধিক ঘামা
- রাতের ঘাম

**বিরল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** 1,000 জনের মধ্যে 1 জনকে প্রভাবিত করতে পারে

- সাময়িক একতরফা মুখ ঝুলে যাওয়া
- অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া যেমন আমবাত বা মুখ ফুলে যাওয়া

**খুব বিরল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** 10,000 জনের মধ্যে 1 জনকে প্রভাবিত করতে পারে

- হার্টের পেশীর প্রদাহ (মায়োকার্ডাইটিস) বা হার্টের বাইরের আস্তরণের প্রদাহ (পেরিকার্ডাইটিস) যার ফলে শ্বাসকষ্ট, ধড়ফড় বা বুকে ব্যথা হতে পারে

**জানা নেই** (উপলব্ধ তথ্য থেকে অনুমান করা যাবে না)

- গুরুতর এলার্জি প্রতিক্রিয়া
- টিকা দেওয়া অপেক্ষে ব্যাপক ফোলাভাব
- মুখ ফুলে যাওয়া (যেসব রোগীদের মুখের ডার্মাটোলজিক্যাল ফিলার আছে তাদের মুখের ফোলা দেখা দিতে পারে)
- একটি স্বকের প্রতিক্রিয়া যা স্বকে লাল দাগ বা প্যাচ সৃষ্টি করে, যা একটি লক্ষ্য বা "বুল-আই" এর মতো দেখতে হতে পারে এবং একটি গাঢ় লাল কেন্দ্রের চারপাশে ফ্যাকাশে লাল রিং (এরিথেমা মাল্টিফর্ম)
- স্বকে অস্বাভাবিক অনুভূতি, যেমন কাঁপুনি বা হামাগুড়ি দেওয়ার অনুভূতি (প্যারেসিসিয়া)
- অনুভূতি বা সংবেদনশীলতা হ্রাস, বিশেষত স্বকে (হাইপোস্বেসিয়া)

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রিপোর্টিং**

আপনি যদি কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পান, আপনার ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট বা নার্সের সাথে কথা বলুন, এই লিফলেটে তালিকাভুক্ত নয় এমন সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সহ।

এছাড়াও আপনি ইতালীয় মেডিসিন এজেন্সির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সরাসরি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রিপোর্ট করতে পারেন: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>, এবং যদি উপলব্ধ থাকে তাহলে ব্যাচ নম্বর অন্তর্ভুক্ত করুন। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রিপোর্ট করে আপনি এই ওষুধের নিরাপত্তা সম্পর্কে আরও তথ্য প্রদান করতে সাহায্য করতে পারেন।

**5. কিভাবে Comirnaty Original/Omicron BA.1 সংরক্ষণ করবেন**

এই ওষুধটি শিশুদের দৃষ্টি এবং নাগালের বাইরে রাখুন।

সঞ্চয়স্থান, মেয়াদ শেষ হওয়া এবং ব্যবহার এবং পরিচালনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের জন্য উদ্দিষ্ট।

মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের পরে এই ওষুধটি ব্যবহার করবেন না যা শক্ত কাগজে বলা আছে এবং "Scad" লেবেল করা আছে। মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখটি সেই মাসের শেষ দিনকে বোঝায়।

-90 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে -60 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ফ্রিজে সংরক্ষণ করুন।

আলো থেকে রক্ষা করার জন্য মূল প্যাকেজে সংরক্ষণ করুন।

-90 °C থেকে -60 °C তাপমাত্রায় ভ্যাকসিন হিমায়িত করা হবে। হিমায়িত ভ্যাকসিন প্রাপ্তির পরে হয় -90 °C থেকে -60 °C বা 2 °C থেকে 8 °C তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

-90 °C থেকে -60 °C তাপমাত্রায় হিমায়িত অবস্থায় সংরক্ষণ করা হলে, ভ্যাকসিনের 10-শিশির প্যাকগুলি 2 °C থেকে 8 °C তাপমাত্রায় 6 ঘন্টার জন্য গলানো যেতে পারে বা পৃথক শিশিগুলি ঘরের তাপমাত্রায় (30 °সে পর্যন্ত) গলানো যেতে পারে) 30 মিনিটের জন্য।

একবার ফ্রিজার থেকে সরানো হলে, খোলা না করা শিশিটি 2 °C থেকে 8 °C তাপমাত্রায় 10 সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যেতে পারে এবং পরিবহন করা যেতে পারে; মুদ্রিত মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ ("Scad") অতিক্রম করবে না।

বাইরের শক্ত কাগজটি 2 °C থেকে 8 °C তাপমাত্রায় নতুন বাতিল তারিখ দিয়ে চিহ্নিত করা উচিত। একবার গলানো হলে, টিকা আবার হিমায়িত করা যাবে না।

ব্যবহারের আগে, খোলা না করা শিশিগুলি 8 °C এবং 30 °C এর মধ্যে তাপমাত্রায় 12 ঘন্টা পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

গলানো শিশিগুলি ঘরের আলোর পরিস্থিতিতে পরিচালনা করা যেতে পারে।

প্রথম পাংচারের পরে, ভ্যাকসিনটি 2 °C থেকে 30 °C তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন এবং 12 ঘন্টার মধ্যে ব্যবহার করুন, যার মধ্যে 6 ঘন্টা পর্যন্ত পরিবহন সময় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কোনো অব্যবহৃত ভ্যাকসিন বাদ দিন।

আপনি যদি কণা বা বিবর্ণতা লক্ষ্য করেন তবে এই ভ্যাকসিনটি ব্যবহার করবেন না।

বর্জ্য জল বা ঘরের বর্জ্য দিয়ে কোনো ওষুধ ফেলে দেবেন না। আপনার ফার্মাসিস্টকে জিজ্ঞাসা করুন যে ওষুধগুলি আপনি আর ব্যবহার করেন না কীভাবে ফেলে দেবেন। এই ব্যবস্থাগুলি পরিবেশ রক্ষা করতে সাহায্য করবে।

## 6. প্যাকের বিষয়বস্তু এবং অন্যান্য তথ্য

### Comirnaty Original/Omicron BA.1-এ যা আছে

- সক্রিয় পদার্থ হল COVID-19 mRNA ভ্যাকসিন যাকে বলা হয় tozinameran/ritozinameran। শিশিতে 0.3 mL এর 6 ডোজ রয়েছে যার প্রতি ডোজ 15 মাইক্রোগ্রাম টিজিনামেরান এবং 15 মাইক্রোগ্রাম রিল্টোজিনামেরান (Omicron BA.1) রয়েছে।
- অন্যান্য উপাদান হল:
  - ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) (ALC-0315)
  - 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159)
  - 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC)
  - কোলেস্টেরল
  - ট্রোমেটামল
  - ট্রোমেটামল হাইড্রোক্লোরাইড
  - স্ক্রোজ
  - ইনজেকশনের জন্য জল

### Comirnaty Original/Omicron BA.1 দেখতে কেমন এবং প্যাকের বিষয়বস্তু কেমন

ভ্যাকসিন হল একটি সাদা থেকে অফ-হোয়াইট ডিসপ্রেশন (pH: 6.9 - 7.9) একটি 2 মিলি ক্লিয়ার শিশিতে (টাইপ I গ্লাস) 6 ডোজের মাল্টিডোজ শিশিতে, একটি রাবার স্টপার এবং একটি ধূসর ক্লিপ-অফ প্লাস্টিকের ক্যাপ এবং অ্যালুমিনিয়াম সীল সহ।

প্যাক আকার: 10 শিশি বা 195 শিশি

সব প্যাক মাপ বাজারজাত করা হতে পারে না।

### মার্কেটিং অনুমোদন ধারক

BioNTech Manufacturing GmbH  
An der Goldgrube 12  
55131 Mainz  
জার্মানি  
ফোন: +49 6131 9084-0  
ফ্যাক্স: +49 6131 9084-2121  
service@biontech.de

### নির্মাতারা

BioNTech Manufacturing GmbH  
Kupferbergterrasse 17 - 19  
55116 Mainz  
জার্মানি

Pfizer Manufacturing Belgium NV  
Rijksweg 12  
2870 Puurs  
বেলজিয়াম

এই ওষুধ সম্পর্কে যেকোনো তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে মার্কেটিং অথরাইজেশন হোল্ডারের স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করুন:

**België/Belgique/Belgien**  
**Luxembourg/Luxemburg**  
Pfizer S.A./N.V.  
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

**България**  
Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон  
България  
Тел: +359 2 970 4333

**Česká republika**  
Pfizer, spol. s r.o.  
Tel: +420 283 004 111

**Danmark**  
Pfizer ApS  
Tlf: +45 44 201 100

**Deutschland**  
BioNTech Manufacturing GmbH  
Tel: +49 6131 90840

**Eesti**  
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal  
Tel: +372 666 7500

**Ελλάδα**  
Pfizer Ελλάς Α.Ε.  
Τηλ.: +30 210 6785 800

**España**  
Pfizer, S.L.  
Tel: +34914909900

**France**  
Pfizer  
Tél +33 1 58 07 34 40

**Hrvatska**  
Pfizer Croatia d.o.o.  
Tel: +385 1 3908 777

**Lietuva**  
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje  
Tel. +370 52 51 4000

**Magyarország**  
Pfizer Kft  
Tel: +36 1 488 3700

**Malta**  
Vivian Corporation Ltd.  
Tel: +35621 344610

**Norge**  
Pfizer AS  
Tlf: +47 67 526 100

**Nederland**  
Pfizer BV  
Tel: +31 (0)10 406 43 01

**Österreich**  
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H  
Tel: +43 (0)1 521 15-0

**Polska**  
Pfizer Polska Sp. z o.o.  
Tel.: +48 22 335 61 00

**Portugal**  
Laboratórios Pfizer, Lda.  
Tel: +351 21 423 5500

**România**  
Pfizer Romania S.R.L  
Tel: +40 (0) 21 207 28 00

**Slovenija**  
Pfizer Luxembourg SARL  
Pfizer, podružnica za svetovanje s področja  
farmacevtske dejavnosti, Ljubljana  
Tel.: +386 (0) 1 52 11 400

**Ireland**

Pfizer Healthcare Ireland  
Tel: 1800 633 363 (toll free)  
+44 (0)1304 616161

**Slovenská republika**

Pfizer Luxembourg SARL,  
organizačná zložka  
Tel: +421 2 3355 5500

**Ísland**

Icepharma hf  
Simi: +354 540 8000

**Suomi/Finland**

Pfizer Oy  
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

**Italia**

Pfizer S.r.l.  
Tel: +39 06 33 18 21

**Sverige**

Pfizer AB  
Tel: +46 (0)8 550 520 00

**Κύπρος**

Pfizer Ελλάς A.E. (Cyprus Branch)  
Τηλ: +357 22 817690

**United Kingdom (Northern Ireland)**

Pfizer Limited  
Tel: +44 (0) 1304 616161

**Latvija**

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā  
Tel.: +371 670 35 775

**এই লিফলেটটি শেষবার 09/2022 সালে সংশোধিত হয়েছিল**

এই ওষুধটি তথাকথিত 'শর্তাধীন অনুমোদন' প্রকল্পের অধীনে অনুমোদিত হয়েছে। এর মানে হল যে এই ঔষধি পণ্যের আরও প্রমাণ অপেক্ষা করছে। এই ঔষধি পণ্যের নতুন তথ্য অন্তত প্রতি বছর পর্যালোচনা করা হবে এবং এই লিফলেটটি প্রয়োজন অনুসারে আপডেট করা হবে।

অন্যান্য ভাষায় লিফলেট পেতে মোবাইল ডিভাইস দিয়ে কোডটি স্ক্যান করুন।



URL: [www.comirnatyglobal.com](http://www.comirnatyglobal.com)

এই ওষুধের বিস্তারিত তথ্য ইউরোপীয় মেডিসিন এজেন্সির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়, <http://www.ema.europa.eu/>

ইউরোপীয় মেডিসিন এজেন্সির ওয়েবসাইটে এই লিফলেটটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন/ইউরোপীয় অর্থনৈতিক এলাকার সব ভাষায় পাওয়া যায়।

**নিম্নলিখিত তথ্য শুধুমাত্র স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের জন্য উদ্দেশ্যে করা হয়েছে:**

Comirnaty Original/Omicron BA.1 এর ডোজ হল 0.3 mL এবং এটি ইন্ট্রামাসকুলারভাবে দেওয়া হয়।

Comirnaty Original/Omicron BA.1 এবং একটি COVID-19 ভ্যাকসিনের শেষ ডোজ গ্রহণের মধ্যে কমপক্ষে 3 মাসের ব্যবধান থাকা উচিত।

Comirnaty Original/Omicron BA.1 শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিদের জন্য নির্দেশিত যারা আগে COVID-19-এর বিরুদ্ধে অন্তত একটি প্রাথমিক টিকা গ্রহণ করেছেন।