

## Kdaj boste prejeli drugi odmerek cepiva?

Po prejemu prvega odmerka cepiva boste dobili nov termin za drugi odmerek ki mora od prvega biti oddaljen **od 78 do 84 dni**.

Bistveno je, da prejmete oba odmerka cepiva: **en sam odmerek ne ščiti pred virusom**.

Če se na dan drugega odmerka ne počutite dobro, počakajte, da popolnoma okrevate (drugi odmerek lahko prejmete do največ **12 tednov** po prvem).



## Prijava neželenih učinkov po cepljenju

Morebitne neželene učinke po cepljenju lahko prijavite na platformi Vigifarmaco ([www.vigifarmaco.it](http://www.vigifarmaco.it)).

## Dodatne informacije


Cepivo, ki ste ga prejeli, zmanjšuje možnost, da zbolite za covidom-19, vendar tveganja ne izniči.

Zaščita, ki jo zagotavlja cepivo, se začne vzpostavljati 21 dni po prvem odmerku, **popolna pa bo 15 dni po prejemu drugega odmerka**.

Še naprej upoštevajte priporočila za preprečevanje širjenja okužbe:

1. omejevanje socialnih stikov
2. nošenje maske
3. pogosto umivanje rok

Shranite t. i. zeleno potrdilo, ki ste ga prejeli po prvem odmerku, in ga **prinesite s seboj na dan drugega odmerka**.



Brošuro je pripravil Kompleksni oddelek za podporno farmacevtsko službo julijskega območja Priloga 9.5 P ostopek za COVID 19 Vaccine AstraZeneca®



Kaj lahko pričakujete po cepljenju proti covidu 19 s cepivom VAXZEVRIA Vaccine AstraZeneca®

## Možni neželeni učinki

- Glavobol
- Slabost/bruhanje
- Driska
- Bolečina na mestu vboda
- Srbenje
- Utrujenost
- Slabo počutje
- Gripi podobni simptomi
- Aksilarna limfadenopatija



V primeru vročine vzemite 500 mg paracetamola (do največ 3000 mg na dan, razdeljenih na 6 odmerkov).

## Ali lahko zaradi cepljenja zbolimo za covidom 19?

**Ne**, možno je, da ste bili okuženi že pred cepljenjem, a niste imeli simptomov.

## Ali lahko po cepljenju opravljam običajna vsakodnevna opravila?

**Da**, a upoštevajte naslednja priporočila:

- če vas boli roka, ne dvigujte težkih predmetov
- če ste utrujeni, počivajte ter se izogibajte vožnji in upravljanju strojev.



## Ne hodite na cepljenje, če:

- imate pred cepljenjem simptome, ki jih je mogoče pripisati covidu-19
- ste v samoizolaciji
- čakate na rezultat brisa

## Cepiva proti covidu-19 niso medsebojno zamenljiva

Kdor je prejel prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Astrazeneca mora tudi za drugi odmerek prejeti cepivo **istega proizvajalca**

## Trombocitopenija in motnje koagulacije

Pri osebah, ki se zdravijo z antikoagulantni ali imajo težave s strnjevanjem krvi, je možen pojav krvavitav ali modric okoli mesta vboda.



**Nemudoma** poiščite zdravniško pomoč, če se v treh tednih po cepljenju pojavi kateri od naštetih simptomov:

- zasoplost
- bolečine v prsih ali želodcu
- otekanje ali občutek mraza v rokah ali nogah
- nevrološki simptomi, kot sta hud in vztrajen glavobol ter zamegljen vid
- pojav manjših modric ali rdečkastih madežev po telesu