

Questionario Adolescenti

Società Italiana di Pediatria

- 10.000 questionari restituiti in due mesi



15% autolesionismo

- sollievo
- piacere

- disagio sempre più precoce
- sessualità
- dipendenze
- bullismo e cyberbullismo
- famiglia

Società Italiana di Pediatria 2017

CARCINOMA CERVICE UTERINA

IARC 2012

- quarto tumore nelle donne
- settimo tumore in assoluto

500.000 nuovi casi /anno (tasso incidenza standardizzato 14/100.000)

84% PAESI POVERI

16% PAESI RICCHI

42,7% Africa Orientale

MORTALITA'

265.000 $\begin{cases} \rightarrow 230.500 \text{ (87\%)} \text{ paesi poveri} \\ \rightarrow 34.500 \text{ (13\%)} \text{ paesi ricchi} \end{cases}$

CARCINOMA CERVICE UTERINA

IARC 2012


EUROPA

- Incidenza: 67.000 casi (11x100.000)
- Decessi : 28.000 (3,8x100.000)

ITALIA

- Incidenza: 2008 (14x100.000)
2012 (4x100.000)
- Mortalità: 2008 (7x100.000)
2012 (1,5x100.000)

CARCINOMA CERVICE UTERINA DATI SCREENING 1999 - 2016 TRIESTE



Fonte dati: Anatomia Patologica ASUITS 2017

CARCINOMA CERVICE UTERINA DATI SCREENING 1999 - 2016 TRIESTE

Primo round 1999 -2001

36 carcinomi squamosi

Ultimo round 2014 -2016


13 carcinomi squamosi (4 nuovi casi all'anno)

Fonte dati: Anatomia Patologica ASUITS 2017

LINEE GUIDA CANADESI PER IMMIGRATE RICHIEDENTI ASILO

Popolazione ad alto rischio di Infezione HPV

positività all'HIV
violenza sessuale



Consigliato:

- vaccinazione HPV età 9-26 anni
- Pap test a tutte le donne sessualmente attive
- personale sanitario femminile